

肤痒颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：肤痒颗粒

汉语拼音：Fuyang Keli

【成份】苍耳子(炒、去刺)、地肤子、川芎、红花、白英。

辅料为糊精、甜菊素。

【性状】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。

【功能主治】祛风活血，除湿止痒。用于皮肤瘙痒病，荨麻疹。

【规格】每袋装6克(无糖型)

【用法用量】开水冲服，一次半袋~1袋，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：

胃肠道系统：恶心、呕吐、口干、腹泻、腹痛、腹胀、便秘、腹部不适、

胃灼热、返酸等。

皮肤及皮下组织：皮疹、丘疹、水疱、红斑、皮肤肿胀等。

其他：口周麻木、头晕、头痛、乏力、心悸、胸闷、失眠、嗜睡、潮

红、过敏反应等。

【禁忌】1. 孕妇禁服。2. 对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 消化道溃疡者慎用。

2. 因胃病、糖尿病、黄疸、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，应以治疗

病因为主。若需用本品时，应在医师指导下服用。

3. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。

4. 月经期妇女及有出血倾向者不宜服用。

5. 服药期间如出现口唇发麻应当立即停药。如皮肤出现红斑、丘疹、

水疱等其他皮疹时，应当去医院就诊。

6. 服用一周后，症状无改善者，应去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，

详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用复合膜袋，每盒9袋，每盒12袋，每盒18袋。

【有效期】24个月

【执行标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册WS₃-B-1160-92、

药典业发(1999)161号

【批准文号】国药准字Z51021686

【说明书修订日期】2024年12月19日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail: dkyv@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系

每袋装6克

迪康®

DIKANG

www.dikangyaoye.com

OTC
甲类

肤痒颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】**通用名称：肤痒颗粒
汉语拼音：Fuyang Keli
- 【成份】**苍耳子(炒、去刺)、地肤子、川芎、红花、白英。
辅料为糊精、甜菊素。
- 【性状】**本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
- 【功能主治】**祛风活血，除湿止痒。用于皮肤瘙痒病，荨麻疹。
- 【规格】**每袋装3克（无糖型）
- 【用法用量】**开水冲服，一次1袋~2袋，一日3次。
- 【不良反应】**监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：
胃肠系统：恶心、呕吐、口干、腹泻、腹痛、腹胀、便秘、腹部不适、胃灼热、返酸等。
皮肤及皮下组织：皮疹、丘疹、水疱、红斑、皮肤肿胀等。
其他：口周麻木、头晕、头痛、乏力、心悸、胸闷、失眠、嗜睡、潮红、过敏反应等。
- 【禁忌】**1. 孕妇禁服。2. 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】**
1. 消化道溃疡者慎用。
2. 因胃病、糖尿病、黄疸、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，应以治疗病因为主，若需用本品时，应在医师指导下服用。
3. 按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。
4. 月经期妇女及有出血倾向者不宜服用。
5. 服药期间如出现口唇发麻应立即停药。如皮肤出现红斑、丘疹、水疱等其他皮疹时，应当去医院就诊。
6. 服用一周后，症状无改善者，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】**如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【贮藏】**密封。
- 【包装】**药用复合膜袋，每盒10袋，每盒12袋。
- 【有效期】**24个月
- 【执行标准】**《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册WS₃-B-1160-92、
药典业发(1999)161号
- 【批准文号】**国药准字Z51021686
- 【说明书修订日期】**2024年12月19日
- 【上市许可持有人】**成都迪康药业股份有限公司
地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
- 【生产企业】**成都迪康药业股份有限公司
生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
邮政编码：611731
电话号码：4006607322
传真号码：028-87845888
注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
E-mail: dkyy@dikangyaoye.com
如有问题可与生产企业联系

每袋装3克

好迪康®

DIKANG
www.dikangyaoye.comOTC
甲类

肤痒颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】通用名称：肤痒颗粒
汉语拼音：Fuyang Keli
- 【成份】苍耳子(炒、去刺)、地肤子、川芎、红花、白英。
辅料为糊精、甜菊素。
- 【性状】本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦。
- 【功能主治】祛风活血，除湿止痒。用于皮肤瘙痒病，荨麻疹。
- 【规格】每袋装3克（无糖型）
- 【用法用量】开水冲服，一次1袋~2袋，一日3次。
- 【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应报告：
胃肠系统：恶心、呕吐、口干、腹泻、腹痛、腹胀、便秘、腹部不适、胃灼热、返酸等。
皮肤及皮下组织：皮疹、丘疹、水疱、红斑、皮肤肿胀等。
其他：口周麻木、头晕、头痛、乏力、心悸、胸闷、失眠、嗜睡、潮红、过敏反应等。
- 【禁忌】1.孕妇禁用。2.对本品及所含成份过敏者禁用。
- 【注意事项】
1.消化道溃疡者慎用。
2.因肾病、糖尿病、黄疸、肿瘤等疾病引起的皮肤瘙痒，应以治疗病因为主，若需用本品时，应在医师指导下服用。
3.按照用法用量服用，小儿应在医师指导下服用。
4.月经期妇女及有出血倾向者不宜服用。
5.服药期间如出现口唇发麻应当立即停药。如皮肤出现红斑、丘疹、水疱等其他皮疹时，应当去医院就诊。
6.服用一周后，症状无改善者，应去医院就诊。
7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8.本品性状发生改变时禁止使用。
9.儿童必须在成人监护下使用。
10.请将本品放在儿童不能接触的地方。
11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【贮藏】密封。
- 【包装】药用复合膜袋，每盒15袋。
- 【有效期】24个月
- 【执行标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册WS₃-B-1160-92、
药典业发(1999)161号
- 【批准文号】国药准字Z51021686
- 【说明书修订日期】2024年12月19日
- 【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司
地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
- 【生产企业】成都迪康药业股份有限公司
生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
邮政编码：611731
电话号码：4006607322
传真号码：028-87845888
注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号
E-mail: dkyv@dikangyaoye.com
如有问题可与生产企业联系

3克/袋×15袋/盒